

Aktuelle Nmin - Werte im Ackerbau 2017

Region 2: Moselgau-Saargau-Bliesgau				
Probenahmezeitpunkt : 1/2. KW Februar 2017				
Nmin - Beprobung in	:	Anzahl der	:	kg Nmin / ha
		Proben	:	0 - 30 cm : 30 - 60 cm :
				Summe

Wintergerste	:	3	:	25	:	37	:	62
Winterweizen	:	10	:	27	:	40	:	67
Winterroggen	:	1	:	10	:	18	:	28
Winterraps	:	6	:	24	:	40	:	64
Triticale	:	2	:	49	:	60	:	109
Sommergerste	:	5	:	27	:	42	:	69
Mais	:	1	:	36	:	24	:	60
Ackerbohnen	:	1	:	48	:	33	:	81
Kopfsalat	:	1	:	20	:	13	:	33
Hafer	:	1	:	25	:	21	:	46
Sommerweizen	:	1	:	36	:	29	:	65

Düngeempfehlungen : (in kg N / ha)

Wintergerste	:	40 kg / ha als 1.Gabe zu Vegetationsbeginn 40 kg / ha als 2. Gabe ab Schossbeginn 60 kg / ha als 3. Gabe ab Erscheinen des Fahnenblattes
Winterweizen	:	50 kg / ha als 1.Gabe zu Vegetationsbeginn 45 kg / ha als 2. Gabe ab Schossbeginn 65 kg / ha als 3. u. 4. Gabe ab Erscheinen des Fahnenblattes 30 kg / ha ggfls. als Qualitätsdüngung
Winterroggen	:	45 kg / ha als 1.Gabe zu Vegetationsbeginn 30 kg / ha als 2. Gabe ab Schossbeginn 40 kg / ha als 3. Gabe ab Erscheinen des Fahnenblattes
Winterraps	:	120 kg / ha ab Vegetationsbeginn, in zwei Gaben (80 / 40 kg)
Triticale	:	25 kg / ha als 1. Gabe zu Vegetationsbeginn 35 kg / ha als 2. Gabe ab Schossbeginn 50 kg / ha als 3. u. 4. Gabe ab Erscheinen des Fahnenblattes 30 kg / ha ggfls. als Qualitätsdüngung
Sommergerste	:	60 kg / ha zur Saat (als Braugerste)
Mais	:	125 kg / ha ab Saat bis 6-Blatt Stadium, in zwei Gaben (80 / 45 kg)
Hafer	:	30 kg / ha als 1. Gabe ab Saat bis zum Auflaufen 40 kg / ha als 2. Gabe ab Schossbeginn
Sommerweizen	:	40 kg / ha als 1.Gabe zur Saat 50 kg / ha als 2. Gabe ab Schossbeginn 60 kg / ha als 3. u. 4. Gabe ab Erscheinen des Fahnenblattes

30 kg / ha ggfls. als Qualitätsdüngung

\\srvluafs02\home\$\m.beier\Desktop\Beier\Documents\Documents (3)\LWK\Stickstoffdüngempfehlungen\2017\SAAR22017.doc